Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Telefon: +36/30 216-6303
nbi@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **8360/17716-2/2025**
Tárgy: **Switch 62,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Vajnorák Zsófia
Oldalak száma: 2
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.) által képviselt **Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc) ügyfélnek a **Switch 62,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság a **Switch 62,5 WG gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *04.2/4327-1/2015. NÉBIH* számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 1.3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

1.3. Engedélyokirat érvényessége: **2026. június 30.**

A határozat jogerőre emelkedését követően gyártott tételek a jelen határozat alapján jóváhagyott címkeszöveggel kerülhetnek forgalomba. A megváltozott termékcímkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Az eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a jelen határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indokolás része nem nyilvános.”

Budapest, 2025. április 29.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél/ügyfél meghatalmazottja - *elektronikusan*
2. Irattár

(237/2025)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi és Borászati Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.
☎ +36 30 216 6303
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
www.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai:

1.1. Engedélyokirat száma:	**04.2/4327-1/2015.**
1.2. Növényvédő szer neve:	**Switch 62,5 WG**
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	**2026. június 30.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	**Syngenta AG** (CH-4002 Basel, Svájc)
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	**Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz u. 2.)

2. A növényvédő szer adatai:

2.1. Növényvédő szer gyártója:	**Syngenta Supply AG** (CH-4002 Basel, Svájc)
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	**gombaölő szer**
2.3. Növényvédő szer formulációja:	*vízben diszpergálható granulátum* **(WG)**

***2.4. Növényvédő szer összetétele**:*

2.4.1. Hatóanyag (1)	*ISO név*	**ciprodinil**
	CAS szám	*121522-61-2*
	IUPAC név	*(4-ciklopropil-6-metil- pirimidin-2-il)-fenil-amin*
	tiszta hatóanyag részaránya	375 g/kg
2.4.2. Hatóanyag (2)	*ISO név*	**fludioxonil**
	CAS szám	*131341-86-1*
	IUPAC név	*4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirrol-3-karbonitril*
	tiszta hatóanyag részaránya	250 g/kg

3. Minőségi követelmények:

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. **ciprodinil** (HPLC/UV)	**37,5 ± 1,88% (m/m)**
3.1.2. **fludioxonil** (HPLC/UV)	**25 ± 1,25% (m/m)**

3.2. Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a „WG” formuláció FAO követelményeinek

Tájékoztató jellegű adat:

megjelenés: világos barna színű, jellegtelen szagú, szilárd anyag

térfogatsűrűség (tömörített): 0,537 g/cm3

pH (1%-os oldat): 9,3

tartós habképződés (1,2%-os oldat, 1 perc): 24 ml

nedves szitamaradék (75-µm-es szitán): <0,01%

4. Felhasználásra vonatkozó előírások:

Kultúra	**Károsító**	**A kezelések maximális száma**	**Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)**	**Dózis (kg/ha)**	**Permetlé (l/ha)**	**A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)**
szőlő *(bor-, csemege-)*	szürkepenész	2	14	0,8-1,0	400-1000	virágzástól (BBCH 60) érés kezdetéig (BBCH 81)
szőlő *(bor-, csemege-)* fürtzóna kezelése				0,4-0,5	300-500	
szamóca	szürkepenész	2	10	1,0	500-600	első virágzatok megjelenésétől (BBCH 55) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)

málna, szeder	szürkepenész	3	7	1,0	500-1500	virágzás kezdetétől (BBCH 61) 2 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 84)
csonthéjasok *(cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi)*	monília	2	7	0,8-1,0	600-1500	első virágok nyílásától (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
szilva			10			
almaterméűek *(alma, körte, birs, naspolya)*	tárolási betegségek	2	6	0,8	500-1500	virágzás kezdetétől (BBCH 61) 1 héttel betakarítás előtti állapotig (BBCH 86)
salátafélék *(fejes saláta, endívia, borsmustár (rukkola))* (hajtatott, szabadföldi)	szürkepenész, fehérpenész	2	10	0,6	hajtatott: 800-1200 szabad-földi: 400-600	1 leveles állapottól (BBCH 11) végleges fejméret eléréséig (BBCH 49)
mángold	szürkepenész, fehérpenész	2	10	0,6	400-600	1 leveles állapottól (BBCH 11) 50%-os szárvastagságig (BBCH 45)
dísznövények	szürkepenész	3	14	0,8-1,0	500-1200	nincs korlátozás
lencse, csicseriborsó, lóbab	szürkepenész, fehérpenész, aszkohitás betegség	2	10	1,0	300-800	első virágbimbók megjelenésétől (BBCH 51) a babszemek kidomborodnak a hüvelyen állapotig (BBCH 79)

tojásgyümölcs (hajtatott)	szürkepenész	2	10	0,8-1,0	500-1500	7. virág nyílásától (BBCH 67) érés kezdetéig (BBCH 81)
cukkini	szürkepenész	2	10	0,8-1,0	500-1200	1 kifejlett terméses állapottól (BBCH 71) termésfejlődésig (BBCH 79)
gumós zeller	alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész	2	14	1,0	300-800	4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökér-vastagságig (BBCH 47)
pasztinák		3		0,8		
gyökér-petrezselyem	alternáriás levélfoltosság, lisztharmat, fehérpenész	2	14	0,8-1,0	300-800	4 leveles állapottól (BBCH 14) 70%-os gyökérvastag-ságig (BBCH 47)
sárgarépa						
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (hajtatott, szabadföldi)	szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegség	2	14	1,0	hajtatott: 300-1000	10. levél megjelenésétől (BBCH 20) dőlés kezdetéig (BBCH 47)
újhagyma (hajtatott, szabadföldi)					szabad-földi: 300-600	5. levél megjelenésétől (BBCH 15) dőlés kezdetéig (BBCH 47)

zöld fűszernövények *(metélőhagyma, metélő-petrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya)*	szürkepenész, fehérpenész, alternáriás betegségek, lisztharmat	2	10	0,6	200-1000	korai virágfejlődéstől 2 héttel betakarítás előtti állapotig
macskagyökér		3				
sárgadinnye (hajtatott)	fehérpenész, kolletotrihumos betegség (fenésedés), kladospóriumos betegség, didimellás betegség	2	10	1,0	600-1200	indanövekedés kezdetétől (BBCH 21) érés kezdetig (BBCH 81)
bodza	levélfoltossá-gok (*Cercospora* sp. *Phoma* sp.) szürkepenész, kocsánybénulás (*Colletotrichum* sp., *Phoma* sp., *Fusarium* sp.)	3	10	1,0	400-1000	betakarítást követően (BBCH 90) érés kezdetéig (BBCH 81)
spenót, sóska	lisztharmat, rozsda	2	10	0,6-0,8	300-600	4 leveles állapottól (BBCH 14) betakarítás előtt 14 nappal
spárga	rozsda	3	10	0,8-1,0	400-800	spárgasípok szedését követően a szárnövekedés végéig
pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák	hópenész, levélfoltosságok és rozsda	2	14	1,0	300-600	beállt gyep állapottól (BBCH 29)

Házi-kerti dózis:

Szamóca, *lencse*, *csicseriborsó*, *lóbab*, *gumós zeller*, *pasztinák*, *vöröshagyma*, *fokhagyma*, *mogyoróhagyma* és *újhagyma* kultúrákban: **20 g/10 liter.**
pázsitok, gyepek, golf- és futball pályák: **10 g/100 m^2**

Minden egyéb engedélyezett kultúra esetében: **10-15 g/10 liter.**

Előírt növényvédelmi technológia:

Szőlőben *(bor-, csemege-)* a készítmény *szürkepenészes betegség* ellen használható fel a fürtzáródási és zsendülési időszakban; megelőző módon, 1-2 alkalommal. A kezeléseket fürtzáródás előtt egyéb szürkepenész ellen engedélyezett, kontakt (pl. folpet) készítményekkel rotációban javasolt végrehajtani. A fürtzáródást követő védekezések járványos fertőzési körülmények mellett is kedvezőbb fürthigiéniát biztosítanak a betegségre érzékeny, vékonyhéjú fajtáknál. Korai érésű csemege- és borszőlőnél a kezelések időpontjának megválasztásához figyelembe kell venni a készítmény élelmezés-egészségügyi várakozási idejét.
A szürkepenész elleni permetezések során a fúvókákat nem az egész lombfal felületre, hanem kifejezetten **a fürtzónára** kell irányítani. A permetezéseket 0,4-0,5 kg/ha dózisban valamint 300-500 l/ha vízmennyiséget alkalmazva kell elvégezni.

Szamócában *szürkepenész* ellen virágzás elején és végén célszerű kijuttatni a készítményt. Erős fertőzésveszély esetén egy harmadik kezelés is szükséges lehet, ezt más hatásmechanizmusú készítménnyel kell végrehajtani.

Málnában és **szederben** a védekezést a virágzás kezdetekor célszerű elkezdeni. A kezeléseket úgy kell elvégezni, hogy nemcsak a virágokat, hanem a hajtásokat és a vesszőket is érje a permetlé. A készítményt egy tenyészidőszakban legfeljebb három alkalommal szabad felhasználni, ezért más hatásmechanizmusú készítményekkel váltogatva kell használni. A megfelelő hatást elősegíti az előző szüret után letermett, beteg valamint felesleges vesszők eltávolítása, illetve a kis málnabogár elleni hatásos védekezés.

Csonthéjasokban *(cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, kajszi)* a készítményt *monília* ellen virágzás kezdetén és végén célszerű kijuttatni, jó permetléfedést biztosító kijuttatás-technika alkalmazásával. A fővirágzáskori kezelést más hatásmechanizmusú készítménnyel kell elvégezni.

Almatermésűekben *(alma, körte, birs, naspolya)* tárolási betegségek ellen érés idején célszerű védekezni egy-két alkalommal a fertőzési nyomás függvényében. A kívánt hatás eléréséhez a permetezést úgy kell végrehajtani, hogy a gyümölcsök felülete megfelelően lefedésre kerüljön.

Hajtatott és szabadföldi **salátafélékben** *(fejes saláta, endívia, borsmustár (rukkola))* és **mángoldban** a *szürkepenész* és *fehérpenész* elleni permetezést a palánták tápkockákba tűzdelése, illetve kiültetése után közvetlenül, majd 10 nap múlva célszerű végezni, nagy lémennyiséggel.

Dísznövényekben a védekezéseket a hajtás és a virágrészek védelme céljából legkésőbb a kezdeti tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A kezelésekhez nedvesítőszer használata javasolt. A további permetezéseket a fertőzés alakulása szerint, 14-16 nap múlva lehet végezni. A készítmény hideg- és melegköd képző gépekkel is kijuttatható, a biológiai hatékonyság csökkenése nélkül.

Lencsében, csicseriborsóban és **lóbabban** a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell megkezdeni, majd szükség esetén 10-14 nap múlva megismételni.

Hajtatott **tojásgyümölcsben** és **cukkiniben** a gombaölő szert termésfejlődés idején lehet felhasználni, majd a kezeléseket a fertőzési veszélytől függően 10-14 nap múlva lehet megismételni. A készítményt minden esetben preventív jelleggel kell kipermetezni.

Zellerben, pasztinákban, gyökérpetrezselyemben és **sárgarépában** *alternáriás levélfoltosság*, *lisztharmat* és *fehérpenész* ellen a kezelést megelőző módon, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni, majd a fertőzés erősségétől függően 14 nap múlva megismételni.

Vöröshagymában, **fokhagymában**, **mogyoróhagymában** és **újhagymában** (hajtatott, szabadföldi) *szürkepenész*, *fehérpenész* valamint *alternáriás levélfoltosság* ellen a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, majd a

fertőzés erősségétől függően 14 nap elteltével megismételni.

Zöldfűszernövényekben *(metélőhagyma, metélő-petrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya, izsóp, kakukkfű, citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya)* és **macskagyökérben** a gombaölő szert *szürkepenész*, *fehérpenész*, *alternáriás levélfoltosságok* és *lisztharmat* ellen megelőző jelleggel kell felhasználni, majd a fertőzés nyomásától függően 10-14 nap múlva megismételni.

Sárgadinnyében *kolletotrihumos* (fenésedés) *kladospóriumos* és *didimellás* betegségek ellen az állománypermetezést az indanövekedés időszakában javasolt végrehajtani egy, esetleg két alkalommal 10-14 napos permetezési forduló betartása mellett. A *fehérpenész* elleni permetezést a palánták tápkockákba tűzdelése, illetve kiültetése után közvetlenül, majd 10 nap múlva célszerű végezni, nagy lémennyiséggel.

Bodzában levélfoltosságok ellen a kezeléseket a kilombosodás időszakától kezdve megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni, majd a fertőzési viszonyoktól függően megismételni. A permetezések a szüret utáni időszakban is szükségessé válhatnak. Szürkepenész és kocsánybénulás ellen a kezeléseket a virágképződés időszakában az érés kezdetéig javasolt elvégezni.

Sóskában és **spenótban** a betegségek ellen 4-8 leveles állapotban javasolt a védekezés végrehajtása közvetlenül a szedést követően. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a permetezés megismétlése, szintén közvetlenül a szedést követően, szükségessé válhat.

Spárgában a *rozsda* elleni védekezést megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor javasolt elkezdeni és fertőzési viszonyoktól függően 10-14 naponként megismételni.

Pázsitokban és **gyepekben** *hópenész* ellen, fagymentes napokon, a készítményt megelőző jelleggel, az őszi gyeptisztítást követően javasolt kijuttatni. A kezelést 14-20 nap múlva célszerű megismételni. *Rozsdák* okozta megbetegedések és *levélfoltosságok* ellen az első tünetek megjelenésekor szükséges elkezdeni a védekezést, majd fertőzési veszélyhelyzettől függően azt megismételni.
A fludioxonil zsírsav szintézis gátló (FRAC kód: 12) kontakt gombaölő szer hatóanyag.
A ciprodinil metionin bioszintézis gátló (FRAC kód: 9) felszívódó gombaölő szer hatóanyag.
***Légi kijuttatás*: nem engedélyezett**

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások:

5.1. Veszélyességi besorolás:

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	**> 2000 mg/ttkg**
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség:	**nem jelölésköteles**
Méhveszélyesség toxicitás alapján:*	*nem jelölésköteles*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*	*nem jelölésköteles*
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok (H-mondat):

H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P-mondat):

P102	Gyermekektől elzárva tartandó.
P270	A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280	Védőkesztyű, védőruha használata kötelező.
P302+P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P333+P313	Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2 Különleges S-mondatok:

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 1 A talajvíz védelme érdekében ezt vagy ciprodinilt tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja ugyanazon a területen az előírtnál többször! A ciprodinil kijuttatott éves mennyisége ugyanazon a területen ne haladja meg az 1125 g/ha-t, figyelembe véve a ciprodinil hatóanyag-tartalmú egyéb készítmények felhasználását is!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől *szőlő ültetvény* és az *50 cm magasságot meghaladó dísznövények* esetében **10 m**, *csonthéjas* és *almaterméső gyümölcsös* ültetvényekben **15 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet; *minden egyéb engedélyezett kultúra* esetében **5 m** kezeletlen zárt gyeppel borított biztonsági övezet megtartása elegendő!

SPo2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

5.3. Várakozási idők

5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig)

5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

kultúra	**várakozási idő (nap)**
szőlő *(bor-)*	21
szőlő *(csemege-)*	35
szamóca	3
málna, szeder	10
csonthéjasok *(cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi)*	7
szilva	7
almatermésűek *(alma, körte, birs, naspolya)*	3
salátafélék *(fejes saláta, endívia, borsmustár (rukkola))* (hajtatott, szabadföldi)	7
mángold	14
lencse, csicseriborsó, lóbab	28
tojásgyümölcs (hajtatott)	3
cukkini	3
gumós zeller	14
pasztinák	7
vöröshagyma, fokhagyma, mogyoróhagyma (hajtatott, szabadföldi)	14

kultúra	várakozási idő (nap)
újhagyma (hajtatott, szabadföldi)	14
zöld fűszernövények *(metélőhagyma, metélő-petrezselyem, kapor, levélzeller, angelika, lestyán, szurokfű, borsikafű, tárkony, zsálya,izsóp, kakukkfű,citromfű, rozmaring, koriander, bazsalikom, menta, majoranna, zamatos turbolya)*	14
macskagyökér	7
bodza	28
sárgarépa, gyökérpetrezselyem	7
sárgadinnye (hajtatott)	3
spenót, sóska	7
spárga	előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges
gyep, golfpálya	előírásszerű felhasználás esetén nem szükséges

***5.4. Munkaegészségügyi óvórendszabályok*:**

5.4.1. Egyéni védőfelszerelés

előkészítőknek: védőkesztyű
kijuttatóknak: védőkesztyű, védőruha
(zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.4.2. Elsősegélynyújtás:

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni!

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés

Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.

***5.5. Egyéb környezetvédelmi előírások*:**

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

6. Kiszerelés, csomagolás:

6.1. A kiszerelés tömege:	1x400 kg, 1x10 kg, 4x5 kg, 10x1 kg, 30x400 g, 20x300 g, 20x100 g, 6x100 g, 10 g	0,75 g (csak dísznövények esetében)
6.2. A csomagolószer anyaga:	HDPE, papír/PE-EVOH	HDPE szórófejes flakon (csak dísznövények esetében)

7. Eltarthatósági idő:

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő: **3 év**

8. Forgalmazási kategória:

20x300 g, 20x100 g, 6x100 g, 10 g, 0,75 g	**III.**
1x400 kg, 1x10 kg, 4x5 kg, 10x1 kg, 30x400 g	**II.**

Budapest, 2025. április 29.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.