Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Növényvédelmi Igazgatóság
1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
Telefon: +36/30 216-6303
ni@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

Ikt. sz.: **8360/100109-2/2025**
Tárgy: **Ridomil Gold R gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása
Ügyintéző: Csató Barbara
Oldalak száma: 2
Mellékletek: Forgalomba hozatali és felhasználási engedélyokirat

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,** mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság), a **Syngenta Kft.** (1117 Budapest, Alíz utca 2.) ügyfélnek a **Ridomil Gold R gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

Az engedélyező hatóság a **Ridomil Gold R gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének megadásáról szóló *8360/52803-1/2025 NÉBIH* számú határozatot – egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint

m ó d o s í t j a:

I. Az engedélyokirat 6. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

6. Kiszerelés, csomagolás

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:	50g, 100g, 400g, 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
6.2. Csomagolószer anyaga:	HDPE, papír/PE/PETP/AI

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az engedély módosítási eljárás díja 25.000 Ft, amelyet az ügyfél köteles a kibocsátott számla alapján megfizetni.

Jelen határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási per indítható.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a határozat közlésétől számított harminc napon belül a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (a továbbiakban: NÉBIH) kell benyújtani.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton, a http://anyk.nebih.gov.hu weboldalon keresztül elérhető elektronikus űrlap (ÁNYK nyomtatvány) használatával köteles benyújtani.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető, ennek elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.

INDOKOLÁS

„A Határozat Indoklás része nem nyilvános”

Budapest, 2025. november 19.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.

Kapja:

1. Ügyfél
2. Irattár

(707/2025)

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Növényvédelmi Igazgatóság
✉ 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.
☎ +36 (30) 216-6303
E-mail: ppp.registration@nebih.gov.hu
portal.nebih.gov.hu

FORGALOMBA HOZATALI ÉS FELHASZNÁLÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

1. A növényvédő szer engedélyokirat azonosítási adatai

1.1. Engedélyokirat száma:	**8360/52803-1/2025 NÉBIH**
1.2. Növényvédő szer neve:	**Ridomil Gold R**
1.3. Engedélyokirat érvényessége:	**2026. december 31.**
1.4. Engedélyokirat tulajdonosa:	**Syngenta Kft.** 1117 Budapest, Alíz utca 2
1.5. Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője:	-

2. A növényvédő szer adatai

2.1. Növényvédő szer gyártója:	**Syngenta Crop Protection AG** Rosentalstrasse 67 4058 – Basel Svájc
2.2. Növényvédő szer rendeltetése:	**gombaölő szer**
2.3. Növényvédő szer formulációja:	vízben diszpergálható granulátum (**WG**)

2.4. Növényvédő szer összetétele:

2.4.1. Hatóanyag (1)	*ISO név*	**rézoxiklorid**
	CAS szám	*1332-65-6*
	IUPAC név	*diréz-klorid- trihidroxid*
	tiszta hatóanyag részaránya	**141,9 g/kg**

2.4.2. Hatóanyag (2) **metalaxil-M**

CAS szám *70630-17-0*

IUPAC név *metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-D-alaninát*

tiszta hatóanyag részaránya **19,4 g/kg**

3. Minőségi követelmények

3.1. Hatóanyag tartalom

3.1.1. **rézoxiklorid** (jodometriásan) 14,2 ± 0,85% (m/m)

3.1.2. **metalaxil-M** (GC) 1,94 ± 0,485% (m/m)

3.2.Fizikai-kémiai tulajdonságok: Meg kell felelnie a „**WG**” formuláció FAO követelményeinek

Tájékoztató jellegű adatok:

Megjelenés: enyhén zöldesszürke színű, krétás szagú, szilárd anyag

pH (1%-os hígítás, 25°C): 6,7

Térfogatsűrűség (ömlesztett): 0,846 g/ml

Nedves szitamaradék (75 µm): 0,01 %

Tartós habképződés (0,5%-os hígítás, 1 perc): 48 ml

4. Felhasználásra vonatkozó előírások

Kultúra	**Károsító**	**A kezelések évenkénti maximális száma**	**Két kezelés között eltelt minimális időtartam** *(nap)*	**A kijuttatáshoz szükséges**		**A kezelés ideje** (fenológiai állapot szerint)
				dózis	**vízmennyiség** *(l/ha)*	
szőlő *bor- és csemege*	peronoszpóra	2	10	2,94 kg/10000 m^2 LFF* (max. 5,0 kg/ha)	150-1000	ötödik levél kiterülésétől (BBCH 15) bogyószíneződés kezdetéig (BBCH 81)
burgonya	fitoftórás betegség (burgonyavész)	2	10	5,0 kg/ha	300-600	egy leveles állapottól (BBCH 11) az első virágzat bogyóinak aszottá válásáig (BBCH 89)
paradicsom *szabadföldi*	fitoftórás betegség (paradicsomvész)	1	-	5,0 kg/ha	300-600	ötleveles állapottól (BBCH 15) 40%-os érésig (BBCH 84)

paradicsom *hajtatott*	fitoftórás betegség (paradicsomvész)	2	10	*síkművelés:* 5,0 kg/ha *támrendszeres művelés:* 2,5 kg/10000 m^2 LFF* (max. 5,0 kg/ha)	300-1000	ötleveles állapottól (BBCH 15) 40%-os érésig (BBCH 84)
Kiskultúrás felhasználás a 1107/2009/EK rendelet 51. cikke alapján. Az alábbi felhasználás nincs alátámasztva dél-keleti EPPO zónás biológiai hatékonysági és a kultúrnövényre szelektivitási vizsgálatokkal. A készítmény kijuttatása ebben a kultúrában kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.						
vöröshagyma	peronoszpóra	1	-	5,0 kg/ha	300-600	első levél megjelenésétől (BBCH 11) végső fejátmérő eléréséig (BBCH 49)

** LFF – lombfal felület*

Előírt növényvédelmi technológia:

Virágzó kultúrákban vagy mézharmat és virágzó gyomnövények jelenléte esetén, illetve, ha a területet bármely okból a méhek látogatják, kizárólag méhkímélő technológiával juttatható ki. Ilyenkor a védekezés csak a méhek repülési időszakának befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg. A kezelést 23 óráig be kell fejezni, illetve 23 órától a következő nap alkonyatáig szüneteltetni kell.

Az egy tenyészidőszakban ugyanarra a területre kijuttatott fémréz mennyisége nem haladhatja meg a 4 kg/ha-t.

Szőlőben (bor- és csemege) a *peronoszpóra* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdeni, és a fertőzési veszélyhelyzet függvényében javasolt 10-12 nap elteltével megismételni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a rövidebb (10 napos) permetezési forduló tartása indokolt.

Burgonyában a *fitoftórás betegség (burgonyavész)* elleni védekezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges megkezdeni, és a fertőzési veszélyhelyzet függvényében javasolt 10-12 nap elteltével megismételni. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a rövidebb (10 napos) permetezési forduló tartása indokolt.

Paradicsomban a *fitoftórás betegség (paradicsomvész)* elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt indokolt megkezdeni. **Hajtatott paradicsomban** a kezelés 10-12 nap elteltével megismételhető. Fertőzésre hajlamosító körülmények között a rövidebb (10 napos) permetezési forduló tartása indokolt.

Vöröshagyma kultúrában a *peronoszpóra* elleni kezelést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel a fertőzés bekövetkezése előtt szükséges elvégezni.

Szőlő és **támrendszeres, hajtatott paradicsom** kultúrában a készítmény kijuttatott mennyiségét a kezelendő lombfal felület méretéhez szükséges igazítani. A készítmény egyszeri alkalommal kijuttatott dózisa szőlőben 2,94 kg/10000 m^2 lombfal felület, támrendszeres paradicsomban 2,5 kg/10000 m^2 lombfal felület. Terület egységre vetítve a készítmény egy alaklommal kijuttatott mennyisége nem haladhatja meg az 5,0 kg/ha-t.

A kezelt alapterületre vetített lombfal felület kiszámítása az alábbi képlet segítségével végezhető el:

$$\textit{kezelt lombfal felület } (m^2) = 2 \times \textit{kezelt korona magasság (m)} \times \frac{\textit{kezelt alapterület } (m^2)}{\textit{sorköz (m)}}$$

Az 1 ha alapterületre vetített lombfal felület kiszámításánál a képlet az alábbiak szerint módosul:

$$\textit{kezelt lombfal felület } (m^2) = 2 \times \textit{kezelt korona magasság (m)} \times \frac{10000\ (m^2)}{\textit{sorköz (m)}}$$

A felhasznált vízmennyiséget a lombozat nagyságához, illetve a permetezőgép típusához kell igazítani. Minden esetben törekedni kell a teljes és egyenletes permetlé fedettségre, még a lombozat belsejében is.

A rezisztencia kialakulásának megelőzése érdekében a peronoszpóra, illetve a fitoftórás betegség elleni védekezési program keretén belül, egy tenyészidőszakban, a készítménnyel és az azonos keresztrezisztencia csoportba (FRAC kód: 4) tartozó hatóanyagot tartalmazó készítményekkel együtt összesen 4 kezelés végezhető.

A készítményt preventív módon szükséges kijuttatni. A készítmény felhasználásánál kerülni kell a kuratív (a fertőzés bekövetkeztét követő) kezeléseket. A készítményt más hatásmechanizmusú hatóanyagot tartalmazó és a felsorolt betegségek ellen hatékony fungicidekkel szerrotációban szükséges kijuttatni.

A kijuttatást követően a permetezőberendezés teljeskörű (tartály, permetlé szállítórendszer, fúvókák stb.) és alapos tisztítása szükséges.

Hatásmechanizmus:

A metalaxil-M RNS polimeráz gátló, felszívódó hatóanyag (FRAC kód: 4).
A réz-oxiklorid több hatáshelyen ható, kontakt hatóanyag (FRAC kód: M 01).

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

5. Az emberre, állatra, környezetre való veszélyességre és a biztonságos felhasználásra vonatkozó előírások

5.1. Veszélyességi besorolás

5.1.1. Veszélyességi tulajdonságok

A készítmény p.o. LD_{50} értéke (patkányon):	> 2000 mg/ ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség:	**kifejezetten veszélyes**
Méhveszélyesség:	**mérsékelten kockázatos**
Méhveszélyesség toxicitás alapján:*	*mérsékelten veszélyes*
Méhveszélyesség kockázatbecslés alapján:*	*mérsékelten kockázatos*
Tűzveszélyességi besorolás:	**nem jelölésköteles**

5.1.2. Veszélyességi besorolás a 1272/2008 EK rendelet alapján

GHS Piktogram:



Figyelmeztetés: Figyelem

Figyelmeztető mondatok/H-mondatok

H400*	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok/P-mondatok

P280	Védőkesztyű használata kötelező.
P391	A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH401	Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.
EUH208	Nátrium-malátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

* Címkén nem feltüntetendő adat

5.2. Különleges P-mondatok:

SP 1	A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!
SPe 1	A talaj élő szervezeteinek védelme érdekében ezt, vagy rezet tartalmazó egyéb készítményt ne használja ugyanazon a területen 4,0 kg fémréz/ha/év összegzett dózist meghaladó mennyiségben!
SPe 2	A talajvíz védelme érdekében működő drénezett talajokon, homoktalajokon (Arany-féle kötöttség, KA<30), valamint fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területeken ne használja!
SPe 3	A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **50 m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet, melyből legalább **20 m** növényzettel borított (zárt gyep)!
SPe 8	Méhekre veszélyes! Virágzó kultúrában a méhek napi aktív gyűjtési időszaka idején nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén méhkímélő technológiában alkalmazható!

***5.3. Egyéb környezetvédelmi előírások*:**

A vízi szervezetek védelme érdekében a növényvédő szer használata lejtős területeken (>3% lejtősmeredekség) nem javasolt!

5.4. Várakozási idők:

5.4.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 3 nap

5.4.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Kultúra	**Várakozási idő** *(nap)*
paradicsom *hajtatott és szabadföldi*	**3**
vöröshagyma	**14**
burgonya	**20**
szőlő *bor- és csemege*	**28**

***5.5. Munkaegészségügyi óvórendszabályok*:**

5.5.1. Egyéni védőfelszerelés

5.5.1.1. Előkészítőknek:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)
5.5.1.2.Kijuttatóknak:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)

5.5.1.3.Mezőgazdasági dolgozóknak:	védőkesztyű, munkaruha (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő)

5.5.2. Elsősegélynyújtás:
Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás* esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés* esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. *TILOS hánytatni!*

Terápia: tüneti megfigyelő kezelés
Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs

6. Kiszerelés, csomagolás

6.1. Kiszerelés térfogata/tömege:	50g, 100g, 400g, 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg
6.2. Csomagolószer anyaga:	HDPE, papír/PE/PETP/AI

7. Eltarthatósági idő:
Fizikai-kémiai tulajdonságait **eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban** legalább két évig megőrzi.
Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3** év.

8. Forgalmazási kategória:

50g, 100g **III.**

400g, 500g, 1 kg, 5 kg, 10 kg **I.**

Budapest, 2025. november 19.

dr. Nemes Imre Zoltán
elnök
nevében és megbízásából

Szűcs Csaba
igazgató

P.H.