




**Cabrio Top****Irtható kórokozók:**

-  Lisztharmat
-  Peronoszpóra
-  Szürkepenész

**Általános adatok**

<b>Hatóanyag</b>	50 g/kg <i>piraklostrobin</i> , 550 g/kg <i>metiram</i>
<b>Hatóanyagcsoport</b>	Strobilurin, ditiokarbamát-származék
<b>Forgalmazási kategória</b>	50 g-os kiszerelés felett II. 50 g-os kiszerelésben és alatta III.
<b>Engedély száma</b>	04.2/3026-1/2012
<b>Formuláció</b>	Vízben diszpergálható granulátum (WG)
<b>Kiszerelés</b>	50 g, 1 kg
<b>Eltarthatóság</b>	3 év
<b>Munka-egészségügyi várakozási idő</b>	0 nap
<b>Egyéb információ</b>	—

**Engedélyezett kultúrák**

Kultúra	Károsító / felhasználás	Kijuttatási időszak / fejlettség	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség	
			szerből	vízből
Szőlő (bor- és csemege-szőlő)	Lisztharmat, peronoszpóra, szürkepenész	20-25 centiméteres hajtás-hossztól bogyószíneződésig (BBCH 81); korai fertőzés esetén virágzás előtt	2,0 kg/ha	400–1000 l/ha

Házi kerti alkalmazáskor a készítmény kijuttatása 0,2%-os (20 g/10 liter) koncentrációban javasolt



### Kezelési előírások

Kultúra	Kezelések maximális száma	Két kezelés közötti minimális időtartam	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiaihoz viszonyítva)	É. v. i.
Szőlő (bor- és csemegeszőlő)	3	10 nap	Bogyószíneződés (BBCH 81)	35 nap

### Felhasználási előírások

<b>Hatás / hatásspektrum</b>	Külső és belső élősködő gombák ellen hatékony (szőlő-peronoszpóra, -lisztharmat és szürkerothadás stb.).
<b>Hatáskifejtés</b>	Kvázi-szisztémikus és kontakthatású. A gombák gázcseréjét gátolja.
<b>Permetléporlasztás</b>	Finomcseppes kijuttatás.
<b>Ideális hőmérséklet</b>	Nem befolyásoló tényező.
<b>Ideális időszak</b>	Nem befolyásoló tényező.
<b>Hatásnövelő körülmények</b>	—
<b>Kombinálhatóság</b>	Gombaölő szerekkel nem szükséges, a rovarölő szerek közül Fendona 10 EC készítménnyel kombinálható.
<b>Megjegyzés</b>	<p>Gátolja az öregedési folyamatokat, élénk zöld színt eredményez.</p> <p>Csökkenti a szőlőlisztharmat termőtesteinek számát, ezáltal a következő évi fertőzésveszélyt.</p> <p>A védekezéseket legfeljebb 14 napos időközökkel ajánlott elvégezni. A kezelések közé célszerű egy alkalommal más hatóanyagcsoportba tartozó fungiciddal végzett permetezést beiktatni. A szer alkalmazása előtt és azt követően kontaktkészítmények használata javasolt.</p> <p>A kijuttatás során a permetlé mennyiségét a kezelendő növényállomány fejlettségétől, lombfelületétől és művelésmódjától, valamint az alkalmazott növényvédelmi gép típusától függően kell megválasztani.</p>