



### Irtható kórokozók:

- Diaporte
- Szürkepenész
- Fehérpenész
- Alternária
- Fóma
- Tányérbetegségek

### Általános adatok

Hatóanyag	200 g/l <i>boszkalid</i> , 200 g/l <i>dimoxistrobin</i>
Hatóanyagcsoport	Anilid, strobilurin
Forgalmazási kategória	I.
Engedély száma	740/2006
Formuláció	Vizes szuszpenziókoncentrátum (SC)
Kiszerezés	1 l, 5 l
Eltarthatóság	3 év
Munka-egészségügyi várakozási idő	0 nap
Egyéb információ	—

### Engedélyezett kultúrák

Kultúra	Károsító / felhasználás	Kijuttatási időszak / fejlettség	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség	
			szerből	vízből
Napraforgó	Fehérpenészes, szürkepenészes, diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek	Először 6-8 levélpáros állapotban, majd tányérbetegségi, virágzás kezdetén (BBCH 61-ig)	0,3–0,5 l/ha	300-500 l/ha légi kijuttatás 70-80 l/ha



## Engedélyezett kultúrák (folyt.)

Kultúra	Károsító / felhasználás	Kijuttatási időszak / fejlettség	A kijuttatáshoz szükséges mennyiség	
			szerből	vizből
Őszi káposztarepce, mustár, olajretek	Fehérpenészes, szürkepenészes rothadás, foma és alternária	Először a virágzás idején, majd amikor a becők 50–70%-a ki-fejlődött (BBCH 77-ig)	0,3–0,5 l/ha	300-500 l/ha légi kijuttatás 70-80 l/ha

## Kezelési előírások

Kultúra	Kezelések maximális száma	Két kezelés közötti minimális időtartam	Az utolsó kezelés időpontja (fenológiához viszonyítva)	É. v. i.
Napraforgó	2	14 nap	Virágzás kezdete (BBCH 61)	35 nap
Őszi káposztarepce, mustár, olajretek	2	14 nap	70%-os becőfejlődés (BBCH 77)	35 nap

## Felhasználási előírások

<b>Hatás / hatásspektrum</b>	A rothadást és foltosodást okozó gombabetegségek ellen rendkívül hatékony. Élettani hatással is rendelkezik. Hatástartama egyedülállóan hosszú.
<b>Hatáskifejtés</b>	Szisztemikus, kvázi-szisztemikus és transzlamináris hatású. A mitokondriumok működését, a mitokondriális elektrontranszportot gátolja.
<b>Permetléporlasztás</b>	Finomcseppes kijuttatás.
<b>Ideális hőmérséklet</b>	Nem befolyásoló tényező.
<b>Ideális időszak</b>	Nem befolyásoló tényező.
<b>Hatásnövelő körülmények</b>	—
<b>Kombinálhatóság</b>	Fendona 10 EC-vel, Liquibor <sup>®2</sup> -ral kombinálható.
<b>Megjegyzés</b>	Kijuttatás után egy órával már esőálló. Napraforgóban és őszi káposztarepcebén a korai fenológiában végzett permetezést földi géppel, a későbbit pedig helikopterrel, vagy hidas traktorral célszerű végrehajtani.